

Porady dotyczące astmy dla pacjentów od 12 roku życia

Informacje dla pacjentów

Asthma advice for patients 12 years and over - Polish

Ty lub Twoje dziecko mieliście atak astmy, ale nie musicie zostawać w szpitalu.

Dopilnuj, aby przyjąć (lub aby dziecko przyjęło) wszystkie przepisane lekarstwa. Jeśli Ty lub dziecko macie przepisany Prednisolon (steryd), koniecznie trzeba zażyć całą przepisaną serię leku.

Umów spotkanie z lekarzem w przychodni w ciągu dwóch lub trzech dni.

Kiedy trzeba szukać dalszej pomocy

Jeśli martwisz się, że Tobie lub dziecku się nie poprawia, skontaktuj się z oddziałem Emergency Department w celu uzyskania porady telefonicznej: **01270 612160**.

Niepokojące objawy mogą być następujące:

- Bardziej astmatyczny oddech.
- Częściej trzeba użyć inhalatora, żeby złagodzić objawy
- Brak reakcji na inhalatory.
- Zmiana temperatury ciała lub gorsze samopoczucie.
- Brak możliwości jedzenia ze względu na duszności.
- Rozwijanie się nowych symptomów budzących obawy.

Jeśli będzie Ci brakowało tchu, żeby mówić prawidłowo, zadzwoń pod 999 i poproś o przysłanie karetki.

Niniejsze informacje są również dostępne w formacie audio, w wersji z dużym drukiem i alfabetem Braille'a oraz w innych językach. Aby otrzymać kopię, poproś członka personelu.

Zweryfikowano w maju 2015

Przedrukowano w styczniu 2018 r Przegląd stycznia 2020 r Ref: EC/AE/0150118PL